



La Promessa O.N.L.U.S. - Via Catone 21 - 00192 Roma Tel / Fax 06.397.391.06 (46)

Complicazioni psichiatriche

ALLUCINOSI ALCOLICA

Un soggetto dipendente da alcol, che smette di bere o che riduce molto la quantità di alcol bevuta, può avere allucinazioni visive o uditive nella maggior parte dei casi a contenuto spiacevole. Nelle allucinazioni uditive la persona crede di sentire voci dirette a lui o che parlano di lui. Il disturbo si sviluppa in genere entro le prime quarantotto ore d'astinenza e può durare parecchie settimane o mesi.

Nel tentativo di sfuggire alle voci che lo minacciano, il soggetto può recare danni a sé o agli altri.

DISTURBO AMNESTICO ALCOLICO (o MALATTIA DI KORSAKOFF)

Questa malattia è causata da una carenza vitaminica associata all'uso prolungato d'alcol.

La persona è in stato confusionale, ha difficoltà visive e di coordinazione motoria e può avere anche serie complicazioni di carattere neurologico. Gradualmente questi disturbi diminuiscono, ma può rimanere un deficit di memoria generalmente molto grave per il quale può essere necessaria un'assistenza ed una tutela per tutta la vita.

DEMENZA ASSOCIATA AD ALCOLISMO

In alcune persone dipendenti da alcol si hanno deficit intellettivi globali che compromettono le attività sociali e professionali.

Nei casi di demenza avanzata è necessaria un'assistenza costante perché le persone che ne sono affette dimenticano totalmente se stesse e ciò che le circonda: possono girovagare senza meta, perdersi, arrecare danno a se stesse e agli altri.